

SEPT24N30

RURALE

attitude

Le parasitisme est un sujet ancien mais d'actualité

Le parasitisme est un enjeu majeur : sociétal, environnemental, et économique. Une étude récente indique une perte approximative de 400 millions d'euros pour les ruminants en France due aux helminthoses¹. De fortes marges persistent donc...

Le défi quotidien d'un éleveur est de *Traiter aussi peu que possible mais autant que nécessaire* ce qui nécessite d'adopter de bonnes pratiques de traitement pour anticiper et retarder les résistances.

1 - Genèse de ce nouvel outil

L'idée de développer et de diffuser des outils simples, concrets, efficaces et adaptés à chaque bassin de production en prenant en compte les différentes espèces a été réfléchi.

Partant de ce constat, les vétérinaires adhérents au réseau Vetoccitan, ont décidé de créer des fiches. Afin de coller au mieux aux typicités de productions et aux besoins terrain, il a d'abord été réalisé une enquête permettant de recueillir les différents éléments (conduite d'élevage, météorologie, habitudes de gestion parasitaire, contraintes locales...). Les fiches ont donc été élaborées en collant au plus près de ces données terrain.

Une relecture a enfin été faite par le comité technique du réseau Vetoccitan ainsi que par le Dr Jean Philippe Gartoux (Commission Parasitologie de la SNGTV, vétérinaire à Chateameillant (18)).

2 - Bassins de production retenus

Dans un premier temps 6 bassins de production ont été retenus :

- Production de broutard Massif Central
- Production bovine Pyrénées Atlantiques
- Production ovine lait zone Roquefort (Aveyron)
- Production ovine lait Ossau Iraty (Pyrénées Atlantiques)
- Production Agneaux du Quercy (Lot)
- Production de veaux sous la mère

Dans chaque fiche vous retrouverez :

- La conduite d'élevage mois par mois (période de naissance, de vente, de mise à la reproduction, de mise à l'herbe, de rentrée, etc.)
- La prise en compte des tendances climatiques locales
- Les périodes à risque reconnues de parasitisme et par type de parasite
- Les périodes recommandées (voire impératives) pour la réalisation des

examens complémentaires afin de diagnostiquer le risque parasitaire sur votre élevage. En l'absence d'examen complémentaire, point de thérapeutique.

→ Les périodes de traitement découlant de ce diagnostic


Toutes ces données sont indiquées successivement par catégories d'animaux.

Afin d'en avoir une lisibilité optimale tous ces éléments ont été mis sous la forme d'une frise chronologique. De même, une lecture directe en est permise avec uniquement une fiche A4 recto afin d'avoir toutes les informations rapidement.

3 - Utilisation des fiches

Plusieurs possibilités vont s'offrir à vous.

- › Votre vétérinaire vous proposera d'échanger sur votre situation et votre gestion du parasitisme en s'appuyant sur cette fiche.
- › Ou vous pouvez aussi le solliciter. Il disposera de ces fiches ou vous pourrez au préalable télécharger celles-ci (QR code) afin d'échanger avec lui.



Vous pourrez ainsi conjointement définir par catégorie d'animaux les examens complémentaires à réaliser, à quelle date en fonction de vos pratiques et de vos périodes à risque ainsi que les mesures à mettre en place en fonction des résultats.

Ces préconisations seront explicitement indiquées et datées dans les cases dédiées sur la frise chronologique

4 - Quels bénéfices pour vous ?

→ Un programme de gestion du parasitisme personnalisé. Sortons de la routine.

→ Utilisation au bon moment de la bonne molécule permettant une gestion raisonnée.

→ Réduction des coûts liés aux antiparasitaires mais surtout des pertes liées au parasitisme.

→ Un accompagnement et des échanges sur la problématique parasitaire de votre élevage.

→ Un pense bête toujours disponible et lisible en un clin d'œil. Affichez le dans votre bureau ou autre et vous n'oublierez plus une étape de votre programme de prévention. Et mieux, vous pourrez même anticiper ! La garantie de ne rien oublier.

→ Une sécurité en ayant mis toutes les chances de réussite de votre côté

**Ensemble,
faisons évoluer
la gestion du
parasitisme.
Demandez conseil
à votre vétérinaire**

Pour aller plus loin, consulter
<https://www.pathobetonline.fr/>



Scannez les QR Code pour avoir accès aux fiches

Production de brouillard
Massif Central



Production bovine
Pyrénées Atlantiques



Production ovine lait zone Roquefort
(Aveyron)



Production ovine lait Ossau Iraty
(Pyrénées Atlantiques)



Production Agneaux du Quercy
(Lot)



Production de veaux sous la mère




Référence :

1. Charlier J, Rinaldi L, Musella V, et Al. Initial assessment of the economic burden of major parasitic helminth infection to the ruminant livestock industry in Europe. *Preventive Veterinary Medicine* 2012;182. Doi/10.1016/j.preventmed.2020.105103

V Production de broutards & pression parasitaire en Massif Central



CONDUITE D'ÉLEVAGE




GESTION DU PARASITISME

	Mise à l'herbe	Pâturage	Rentrée à l'étable
Veaux	Strongles <input type="text"/>	▲ Strongles Douves <input type="text"/>	▲ Strongles/Douves/Paramphistomes Ectoparasites <input type="text"/>
Génisses	Strongles Douves G1 <input type="text"/> G2 <input type="text"/> G3 <input type="text"/>	Strongles <input type="text"/>	▲ Strongles Douves Paramphistomes Ectoparasites <input type="text"/>
Vaches		Strongles pulmonaires <input type="text"/>	▲ Strongles Douves Paramphistomes Ectoparasites <input type="text"/>




Production bovine & pression parasitaire en Pyrénées

zoetis



CONDUITE D'ÉLEVAGE



GESTION DU PARASITISME

	Bâtiment	Mise à l'herbe	Pâture	Rentrée à l'étable
Veaux	<p>▲ Strongles Coccidies</p> <input type="text"/>	<p>Strongles</p> <input type="text"/>	<p>▲ En fonction du traitement antiparasitaire de mise à l'herbe et/ou suspicion clinique</p>	<p>▲ Strongles Ectoparasites</p> <input type="text"/>
Génisses		<p>Strongles</p> <p>G1 <input type="text"/></p> <p>G2 <input type="text"/></p> <p>G3 <input type="text"/></p>	<p>▲ Strongles</p> <input type="text"/>	<p>▲ Strongles/Douves Paramphistomes Ectoparasites</p> <input type="text"/>
Vaches				<p>▲ Strongles/Douves/ Paramphistomes/Ectoparasites</p> <input type="text"/>



Production ovine & pression parasitaire en Aveyron


zoetis




Zone Roquefort




CONDUITE D'ÉLEVAGE



GESTION DU PARASITISME - BREBIS



GESTION DU PARASITISME - AGNELLES/ANTENAISES



GESTION DU PARASITISME DES AGNEAUX EN BATIMENT

Parasites prédominants : Coccidies et *Strongyloides* - Coproscopies dès 3 semaines



Production ovine & pression parasitaire en Pyrénées-Atlantiques


zoetis




Zone Ossau Iraty




CONDUITE D'ÉLEVAGE



GESTION DU PARASITISME - BREBIS



GESTION DU PARASITISME - AGNEAUX (sauf si animaux en bergerie) - AGNELLES - ANTENAISES



GESTION DU PARASITISME - AGNEAUX EN BERGERIE

Parasites prédominants : Coccidies et *Strongyloïdes* - Coproscopies dès 3 semaines



Production Agneaux du Quercy dans le Lot

zoetis



Zone Agneaux du Quercy



CONDUITE D'ÉLEVAGE



Mise à l'herbe

Rentrée en Bergerie

Agnelages

Agnelage (à la belle saison possibilité agnelage plein air)

GESTION DU PARASITISME - BREBIS



Parasites prédominants

Petites douves /
Strongles / Oestres

Strongles / Haemonchus / Oestres (Petites douves)

Petites douves / Strongles / Oestres

Traitements éventuels

Coprosopies recommandées



GESTION DU PARASITISME - AGNELLES



Parasites prédominants

Coccidies

Strongles / Tenias

Traitements éventuels

Coprosopies recommandées

Coproscopie recommandée 6 semaines après mise à l'herbe et refaire une coproscopie à la rentrée

GESTION DU PARASITISME - AGNEAUX



Agneaux qui pâturent

Coccidies

Tenias / Strongles

Traitements éventuels

Agneaux en bergerie

Coccidiose / Strongyloïdes

Traitements éventuels

Coprosopies recommandées


Coproscopie agneaux bergerie toute l'année et Agneaux qui pâturent : coproscopie recommandée avant la rentrée en bergerie



Production de veaux sous la mère et pression parasitaire en Aveyron



CONDUITE D'ÉLEVAGE



GESTION DU PARASITISME - VACHE - GENISSE



Parasites prédominants

Strongles

Strongles / Paramphistomes
Grandes douves / Petites douves
Ectoparasites

Coprosopies recommandées



Traitements éventuels

GESTION DU PARASITISME - VEAUX



Parasites prédominants

Coccidies / Strongyloïdes / Ectoparasites

Coprosopies recommandées



Peut être réalisée à n'importe quel moment sur les 12 mois

Traitements éventuels